



Zahlen, Daten, Fakten – der österreichische Suizidbericht

Nestor Kapusta

Medizinische Universität Wien

Suicide Research Group &


Wiener Werkstätte für Suizidforschung

SUPRA - Expertenbeirat

Datenquelle

- Statistik Austria
- Todesursachenstatistik (ICD)
- Seit 1970 elektronisch verfügbar
- International hohe Datenqualität

Suizidraten im europäischen Vergleich



Deutschland


Österreich
Schweiz

Frankreich


Finnland

Quelle: WHO, European HFA Database. 5-Jahres-Mittelwerte (2007–2011) standardisierter Suizidraten pro 100.000


Suizidraten in Österreich seit 1970




Suizidraten im Bundesländervergleich




Suizidraten nach politischem Bezirk




Suizidraten nach Altersgruppen




Suizidraten nach Altersgruppen Frauen




Suizidraten nach Altersgruppen Männer




Verteilung der Suizidmethoden nach Geschlecht (2012)




Verteilung der Suizidmethoden nach Alter



Verteilung der Suizidmethoden im Zeitverlauf



Entwicklung des psychosozialen Systems



Suizidversuche

Internationale Studien gehen davon aus, dass die Zahl der Suizidversuche die Zahl der tatsächlich durch Suizid verstorbenen Personen um das **10- bis 30-Fache** übertrifft (Flavio et al. 2013; Kőlves & De Leo 2013; Spittal et al. 2012; De Munck et al. 2009).

Demnach kann in Österreich von etwa **12.000 bis 38.000** Suizidversuchen **pro Jahr** ausgegangen werden.

Vergiftungen stellen dabei etwa 70 bis **75 Prozent** aller Suizidversuche dar (Flavio et al. 2013; Spittal et al. 2012).

Daten zu intentionalen Selbstvergiftungen der Vergiftungsinformationszentrale

2002 bis 2012


146.000 Vergiftungsmeldungen

25.101 davon intentional

Geschlecht	n	%
männlich	7.740	30,9
weiblich	17.105	68,4
fehlend	171	0,7
Gesamt	25.016	100

Jahr	n	%
2002	2.283	9,1
2003	2.332	9,3
2004	2.234	8,9
2005	2.319	9,3
2006	2.230	8,9
2007	2.271	9,1
2008	2.253	9,0
2009	2.207	8,8
2010	2.435	9,7
2011	2.485	9,9
2012	1.967	7,9
Gesamt	25.016	100

Alter zum Zeitpunkt des Suizidversuchs



Anteil an intentionalen Selbstvergiftungen

1. Antipsychotika, Sedativa und Hypnotika
Psycholeptika: 30,5 %
2. nichtsteroidalen Antiphlogistika und
Antirheumatika 12,5 %
3. Antidepressiva 10,7 %

Präventionsziele:

- Junge Menschen
 - Suizidversuche
 - Medikamentenverschreibung
- Alte Menschen (Männer)
- Restriktion
- Aufklärung und Stärkung des Hilfesuchverhaltens, Behandlung

Suizidales Verhalten

Belastende
Lebensereignisse

Psychiatrische
Erkrankungen

a

bis

e

Suizidgedanken

b

Impulsivität

c

d

Hoffnungslosigkeit

c

d

Verfügbarkeit von
Suizidmitteln

f

Imitation

g

Suizidhandlung

Präventionsmaßnahmen

- a. **Aufklärung der Öffentlichkeit und Ausbildung von**
AllgemeinärztInnen
Schlüsselpersonen (Gatekeeper)
- b. **Screening von Hochrisikopersonen**
- c. **Pharmakologische Behandlung**
- d. **Psychotherapeutische Behandlung**
- e. **Nachsorge nach Suizidversuch**
- f. **Einschränkung der Verfügbarkeit von Suizidmethoden**
- g. **Medienberichterstattung**

Mann et al, 2005